

ヤクハンの主な殺菌消毒剤の適用部位一覧表

製品名	ヤクゾール液10%	グルコン酸 クロルヘキシジン液 「ヤクハン」		アルキニン液10	ザルコラブ	消毒用グルコジン ハンドリキッド0.2%	グルコジンW ・エタノール液0.5%	消毒用エタノール 「ヤクハン」	消毒用エタライト液	70%イソプロ液 「ヤクハン」	ポピヨード液10%	ヤクラックスD液1%	ソレゾールL 20w/v%液 (ニプロファーマ=ヤクハン)
一般名	ベンザルコニウム塩化物	クロルヘキシジングルコン酸塩		アルキルジアミノ エチルグリシン塩酸塩	ベンザルコニウム塩化物 /エタノール	クロルヘキシジングルコン酸塩 /エタノール		エタノール		イソプロパノール	ポピドンヨード	次亜塩素酸ナトリウム	グルタラル
濃度	10w/v%	20w/v%	5w/v% (界面活性剤配合)	10w/v%	0.2w/v%		0.5w/v%	76.9~81.4vol%		70vol%	10w/v%	有効塩素1%	20w/v%
	手指・皮膚	0.05%~0.1%	0.1%~0.5%		0.05%~0.2%	そのまま使用		そのまま使用		そのまま使用		0.01%~0.05%	
	手術部位の皮膚	0.1%5分洗浄後、 0.2%塗布	0.1%~0.5% 0.5%エタノール溶液		0.1%5分洗浄後、 0.2%塗布			そのまま使用	そのまま使用		そのまま使用	0.005%~0.01%	
	手術部位の粘膜	0.01%~0.025%			0.01%~0.05%						そのまま使用	0.005%~0.01%	
	皮膚の創傷部位	0.01%~0.025%	0.05%		0.01%~0.05%						そのまま使用		
	粘膜の創傷部位	0.01%~0.025%			0.01%~0.05%						そのまま使用		
	感染皮膚面	0.01%									そのまま使用		
	熱傷皮膚面										そのまま使用		
	腔洗浄	0.02%~0.05%											
	外陰・外性器		0.02%										
	結膜囊 洗浄・消毒	0.01%~0.05%	0.05%以下										
	医療機器	0.1%10分浸漬	0.1%~0.5% 0.5%エタノール溶液		0.05%~0.2% 10~15分浸漬 (結核領域において使用する 場合)0.2~0.5%	そのまま使用		そのまま使用	そのまま使用	そのまま使用		[医療機器] 0.02~0.05% (HBウイルスの消毒のとき) (1)血液汚染があるとき そのまま使用 (2)汚染がはっきりしないとき 0.1~0.5%	2% (10倍希釈)
	手術室・病室・ 家具・器具・物品	0.05%~0.2%	0.05%		0.05%~0.2% (結核領域において使用する 場合)0.2~0.5%							0.02%~0.05%	0.5% (器具のみ)
	排泄物											0.1%~1%	